A var. *laevissimae* differt floribus albis, petallis 4.

Guizhou (贵州): Yinjiang Xian (印江县), Qishupin (漆树坪) alt. 1040 m, Shi Sheng-de (时圣德) 92013, (模式，存贵州省植物园标本室，Typus! GBG)

本变种与原变种的区别在于花白色，花瓣 4 枚。

致谢　标本承蒙梁畴芬先生和陈书坤先生鉴定，特表感谢。

*　*　*　*　*　*　*　*　*　*

云 南 植 物 研 究　1994; **16** (4): 347—348
Acta Botanica Yunnanica

云南漆树属一新种

陈振峰
（商业部西安生漆研究所，西安 710061）

闵天禄
（中国科学院昆明植物研究所，昆明 650204）

A NEW SPECIES OF THE GENUS TOXICODENDRON FROM YUNNAN

CHEN Zhen-Feng[1],　MING Tien-Lu[2]
([1]*Xian Research Institute of Lacquer*, Xi'an 710061)
([2]*Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences*, Kunming 650204)

关键词　喙果漆
Key word *Toxicodendron rostratum*

喙果漆　新种　图 1

Toxicodendron rostratum Ming et Z.F.Chen, sp. nov.

Affinis *T. succedaneo* (L.) Kuntze, sed foliolis 3—5-jugis, papyraceis, oblongo-lanceolatis, basi subrotundatis, petiolulis alatis decursivis, paniculis breviter 4.5—9 cm longis, paucifloris, petalis enervibus, fructibus haud compressis, apice longi-rostratis, 4—5 mm longis.

Arbor 18 m alta; ramuli hornotini crassi, plus minusve glauci, flavi lenticellati; gemmatis pubescentibus. Folia pinnata, petiolo 6—12 cm longo incluse 17—32 cm longa, glabra; foliola 3—5-juga, opposita, papyracea, oblongo-ovata vel oblongo-lanceolata, 6—13.5 cm longa, 2.5—5 cm lata, apice acuminata, basi subrotundata, margine integra, nervis lateralibus 13—18-jugis utrinque prominentis, petiolulis alatis decursivis, 3-6 mm longis. Paniculae axillares 4.5—9 cm longae, glabrae; flores parvi, circ. 2 mm diam., pedicellis circ. 2 mm longis; sepala 5; ovata, 0.5 mm longa; petala 5, lanceolata, 1.5 mm longa,

1993-12-21 收稿

0.5 mm lata, sub anthesi revoluta; stamina exserta, 1.7 mm longa; disci vadosi poculiformes; ovarium globosum 0.8 mm diam., glabra, styis 1, brevioribus, stigmatibus suflatis trilobis. Drupae ovatae circ. 6 mm diam., 12 mm longae, haud compressae, apice longi-rostratis, 4—5 mm longis.

Yunnan (云南): Menglian (孟连), Lalei (腊垒), 1260 m alt. 1990. 4.28., Chen Zhen-feng (陈振峰), Zhou Yong-nian (周永年) et Dor Sheng-zhi (豆生智) 90031 (Typus, KUN).



图 1 喙果漆 *Toxi codendron rostratum* Ming et Z.F. Chen 1.花枝；2. 果枝；3. 花。(吴锡麟绘)

本种类似于野漆 *T.succedaneum* (L.) Kuntze, 但小叶仅 3—5 对，纸质，大多长圆状披针形，叶片基部下延成翅状柄，总状花序较短，疏花，花瓣无脉纹，核果不压扁，先端具长喙，长 4—5 mm，与后一种明显区别。